

RECONSTITUCIÓN CON ANESTÉSICO

PRODUCTO	INDICACIÓN	PASO 1. Reconstituir el vial liofilizado con AH	PASO 2. Agregar solución salina al vial liofilizado	PASO 3. Agregar 0.5ml de anestésico
low	Jowl	1.5ml	4ml + 1.5ml = 5.5ml	5.5ml + 0.5ml = 6ml
	Doble mentón	1.5ml	4ml + 1.5ml = 5.5ml	5.5ml + 0.5ml = 6ml
medium	Adiposis	1.5ml	18ml + 1.5ml = 19.5ml*	19.5ml + 0.5ml = 20ml
	Celulitis	1.5ml	18ml + 1.5ml = 19.5ml*	19.5ml + 0.5ml = 20ml
high	Cicatrices	1.5ml	1ml + 1.5ml = 2.5ml	2.5 + 0.5ml = 3ml*
	Fibrosis	1.5ml	1ml + 1.5ml = 2.5ml	2.5 + 0.5ml = 3ml*

*Utilizar el vial del líquido reconstituyente para hacer la dilución

*Reconstitución mínima

RECONSTITUCIÓN SIN ANESTÉSICO

PRODUCTO	INDICACIÓN	PASO 1. Reconstituir el vial liofilizado con AH	PASO 2. Agregar solución salina al vial liofilizado
low	Jowl	1.5ml	4.5ml + 1.5ml = 6ml
	Doble mentón	1.5ml	4.5ml + 1.5ml = 6ml
medium	Adiposis	1.5ml	18ml + 1.5ml = 19.5ml*
	Celulitis	1.5ml	18ml + 1.5ml = 19.5ml*
high	Cicatrices	1.5ml	1.5ml + 1.5ml = 3ml**
	Fibrosis	1.5ml	1.5ml + 1.5ml = 3ml**

*Utilizar el vial del líquido reconstituyente para hacer la dilución
 **Reconstitución mínima



www.axiospharma.mx

Distribuidor exclusivo autorizado en México de pbserum.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este
material por cualquier medio sin el previo y expreso
consentimiento de Axios Pharma. Pbserum HA 1.5 Low
Medium High registro no. 1461C2021 SSA III
contacto@axiospharma.mx tel. 5203-1240